



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



## S.R.A.L. POITOU – CHARENTES

Bulletin technique n° 17 du 17 juin 2009 (1 page)

Grandes Cultures

**BLE** : stade laiteux-pâteux à pâteux

### Pucerons

Les populations n'ont pas évolué. Même dans les situations tardives, le stade limite de sensibilité est atteint.

*Fin de la période de risque.*

**TOURNESOL** : stade 4 paires de feuilles à E4

### Ravageurs

En situations tardives (4 à 6 paires de feuilles), les **pucerons** restent présents sur 40 à 70 % des plantes mais le nombre moyen par plante est faible.

Globalement une stagnation des infestations est notée.

*A surveiller en situations très tardives uniquement.*

**Remarque** : depuis une dizaine de jours (notamment en Charente-Maritime), la présence de fortes populations de **chenilles** a été signalée ponctuellement. Il s'agit de *Vanessa Cardui* (Vanesse du chardon ou de l'artichaut, ou « Belle Dame ») ; de fortes migrations de ce papillon ont eu lieu en mai en différentes régions. Elles ont été observées initialement sur les chardons puis sur la culture.

**L'action défoliatrice** est sans incidence significative sur les feuilles supérieures à partir du stade 12 feuilles.

Dans quelques cas particuliers, la défoliation peut être davantage marquée.

Comme il n'existe pas de catégorie d'usage pour ce « ravageur », aucune intervention spécifique n'est autorisée.

**Remarque** : des chenilles de type **noctuelles** sont présentes plus fréquemment sur tournesol (et maïs) dans la région. Si la lutte contre ces chenilles est justifiée, celle-ci est envisageable selon les modalités habituelles (traitements généraux/traitements des parties aériennes/noctuelles).

### Phomopsis

D'après les indications du modèle, plusieurs périodes **favorables aux contaminations** ont eu lieu.

*Pour les situations où un traitement était envisagé et non protégées à ce jour, intervenir dès que possible (à l'exception des rares situations très tardives n'ayant pas atteint le stade E1 ; dans ce cas, l'intervention est à différer d'autant plus qu'aucune pluie n'est prévue pour les prochains jours).*

**MAÏS** : stade 6 à 14 feuilles

### Sésamie - Pyrale

Les captures de **sésamie** se poursuivent en nombre modéré sur environ la moitié des pièges ; en Vienne elles restent très faibles.

Le vol de **pyrale** est également d'intensité modérée, il est très irrégulier selon les sites. Des **pontes** de pyrales ont été observées ponctuellement en très faible nombre (Deux-Sèvres/limite Vienne).

*Les interventions visant ces ravageurs doivent se terminer ces prochains jours notamment en Vienne (pour les situations concernées).*

## REGLEMENTATION

**Avis au J.O.** du 05/06/09, **extrait** relatif à la napropamide :

Concernant la substance active napropamide, l'application de la décision N° 2008/902/CE de la Commission du 7 novembre 2008 de non-inscription de cette substance active a été temporairement suspendue par ordre du 28 avril 2009 du président du tribunal de première instance des Communautés européennes (affaire T-95/09R) jusqu'au 7 mai 2010 ou, alternativement, jusqu'au jugement final.

Ainsi, l'application des dispositions relatives à cette substance active décrites dans l'avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques du 3 février 2009\* (NOR : AGRG0902055V) a été provisoirement suspendue. Les autorités françaises tireront toutes les conséquences de l'arrêt final de la Cour de justice européenne.

\* : Retrait d'A.M.M. 7 mai 2009, délai à la distribution 30 octobre 2009, délai à l'utilisation 7 mai 2010.



**Prochain bulletin** : selon l'actualité

## TOURNESOL

### Phomopsis

Protection nécessaire en situations à risque élevé selon A.A. N° 15

### Pucerons

A surveiller en situations très tardives

### Chenilles défoliatrices

Présence de *Vanessa Cardui*

## MAÏS

### Sésamie-Pyrale

Vols d'intensité modérée

# cochenilles

Ordre : Hémiptères

Sous-Ordre : Sternorrhynques

7691680066000038 00560


Les cochenilles appartiennent à l'Ordre des Hémiptères Sternorrhynques (pucerons, psylles et aleurodes), elle (grec : « Sterno » : poitrine et « Rhyncha » : rostre) qui (punaises), Cicadomorphes (cicadelles) et Fulgoromorphes (fulgures) systématique des Hémiptères au verso)

Les cochenilles sont caractérisées par un din (sont allongés et parfois ailés alors que les femelles sont appendice, dont les organes de locomotion, d'où leur

Les cochenilles passent le plus clair de leurs temps à ponctionner puis à sucer la sève élaborée de la plante attaquée, elles sont, pour la plupart, munies d'un bouclier ayant diverses origines qui permet de les ranger en différentes familles (voir ci dessous).

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE  
DEPOT LEGAL DES PERIODIQUES  
QUAI FRANCOIS MAURIAC  
75706 PARIS CEDEX 13  
FR

## Leucanodiaspididae




Les boucliers femelles sont rendus rigides par l'imprégnation de cires ou de laques. Ex le lecanium du cornouiller : **Parthenolecanium corni** (Bouché 1844).

**Description** : Adulte de 4-6mm sur 4 mm de large, globuleux, brun acajou, légèrement brillant.

**Biologie** : Les larves au 2<sup>e</sup> stade hivernent sur les branches et les troncs. Elles deviennent adultes en avril et émigrent vers les jeunes branches, les pousses et les jeunes feuilles. Celles-ci pondent de la mi-juin à juillet.

**Plantes hôtes** : Prunus, Noisetier, Rosier, Glycine, Ginkgo...

## Pseudococcidae



La femelle est mobile, le bouclier est mou, recouvert d'une fine pruinosité blanche.



Ex : La cochenille farineuse de la viorne **Pseudococcus viburni** (Signoret 1875).

**Description** : Adulte de 4-6mm. Cochenille allongée à corps mou recouvert d'une fine poudre blanche.

**Biologie** : Dans le bassin méditerranéen, l'hivernation a lieu à tous les stades. Suivant la température 4 à 5 générations se succèdent.

**Plantes hôtes** : Ficus, Orchidées, Broméliacées, Cactées, Pelargonium, Viorne ...

## Diaspididae




Le bouclier femelle est formé de la superposition des exuvies larvaires et nymphales. Ex : la cochenille du mûrier : **Pseudaulacaspis pentagona** (Targioni Tozzetti 1886).

**Description** : Bouclier circulaire, diamètre 2,2 à 2,4 mm, blanc à grisâtre. Femelle très large et jaune vif.

**Biologie** : L'hivernation a lieu sous la forme de femelles fécondées. La ponte commence à la fin du mois d'avril et les éclosions débutent fin mai. Une seconde génération apparaît en août et une troisième partielle en automne.

**Plantes hôtes** : Mûrier, Poirier, Orme, Sophora, Fusain...

## Margarodidae



La femelle est mobile, son bouclier est formé d'une sécrétion cirreuse noisette et de filaments cirreux blancs.


Ex : la cochenille australienne **Icerya purchasi** (Maskell 1878)

**Description** : 8 à 10 mm, la femelle est rouge pâle, l'ovisac est blanc pur, cannelé longitudinalement.

**Biologie** : Originaires d'Australie, elle a été observée la première fois en 1912 en France. L'hivernation se fait sous la forme d'oeuf, de larve ou d'adulte. La ponte a lieu en février ou mars. Les jeunes larves sont rouge vif.

**Plantes hôtes** : Citrus, Mimosa, Fabacées ornementales, Rosiers, Lauriers...





**Cochenilles Diaspididae ( *Unaspis euonymi* MacGillivray 1921 ) sur Fusain avec Adulte et larve de *Chilocorus* sp. : coccinelle auxiliaire.**

## Classification des Hémiptères

<u>SOUS-ORDRE</u>	<u>SUPER-FAMILLE</u>
	Aleyrodoidea (Aleurodes)
	Aphidoidea (Pucerons)
<b>Sternorrhyncha</b>	<b>Coccoidea (Cochenilles)</b>
	Phylloxeroidea
	Psylloidea (Psylles)
<b>Cicadomorpha</b> (Cicadelles)	
<b>Fulgoromorpha</b> (Fulgore et autres cicadelles)	
<b>Heteroptera</b> (Punaises)	

## DEGATS

Les cochenilles affectent principalement le tronc ou la tige et les rameaux de l'année. Les piqûres entraînent un ralentissement de croissance de la plante entraînant son dépérissement et parfois la mort. De plus, comme beaucoup de piqueurs-suceurs, elles produisent en abondance du miellat sur lequel se développe une intense fumagine qui occasionne le jaunissement des feuilles qui tombent prématurément. Les cochenilles, selon les familles, sont ovipares, ovovivipares ou vivipares. La fécondité varie d'une trentaine d'œufs à plus de 2000, les œufs sont souvent pondus et protégés sous le bouclier, sous le corps ou encore dans un ovisac. Quelques individus en début de saison peuvent se transformer en colonie de milliers d'individus quelques mois plus tard.



**Cochenilles Diaspididae sur tronc de Citrus**

## LUTTES

### PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE

- *Anthribus* sp. (Coléoptère Athribidés)
- *Novius cardinalis*, *Cryptoloemus montrouzieri*, *Chilocorus* sp. et *Exochomus* sp. (Coléoptère Coccinellidés)
- *Aphytis mytilaspidis* ( Hyménoptère Aphelinidés)
- *Metaphycus* sp. (Hyménoptère Encyrtidés)
- *Pachyneuron coccorum* (Hyménoptère Pteromalidés)

### CHIMIQUE

#### SUBSTANCES ACTIVES AUTORISEES

- Bifenthrine (Pyrethrinioïde de synthèse)
- Thiaclopride (Neonicotinoïde)
- Huile minérale paraffinique
- Huile de vaseline
- Huile de colza

Des essais ont été mis en place sur la cochenille du Mûrier ( *Pseudolacaspis pentagona*, Targioni Tozetti 1886 ) par le **Service Régional de l'ALimentation** Aquitaine, en prévision du retrait de nombreuses molécules actives.

Pour aller plus loin...

- Bonnemaison L. *Les ennemis animaux des plantes cultivées et des forêts tome I Nématodes, Gasteropodes, Myriapodes, Acariens et insectes Hétérométaboles*. Chapitre X : Ordre des Hétéroptères.p 553-554 Ed. SEP 1961